

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów zakażenia meningokokowego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli nie możesz skontaktować się z lekarzem, należy wezwać pogotowie ratunkowe lub uzyskać pomoc doraźną.

Należy pokazać tę kartę osobie należącej do fachowego personelu medycznego.

Tę kartę należy zawsze mieć przy sobie podczas leczenia i przez dwa miesiące po przyjęciu ostatniej dawki zilukoplanu. Zagrożenie zakażeniem meningokokowym może utrzymywać się przez kilka tygodni po przyjęciu ostatniej dawki zilukoplanu.

▼ *Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.*

## Kartę informacyjną pacjenta należy zawsze nosić przy sobie.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów zakażenia meningokokowego należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub poszukać pomocy doraźnej:

- ból głowy występujący jednocześnie z którymkolwiek z następujących objawów:
  - mdłości lub wymioty – sztywny kark – sztywne plecy – gorączka
- gorączka z wysypką lub bez
- nadwrażliwość na światło
- splątanie lub senność
- bóle mięśni z objawami grypopodobnymi

ZILBRYSQ®  
(zilukoplan)

KARTA INFORMACYJNA PACJENTA

Należy okazać KARTĘ INFORMACYJNĄ PACJENTA wszystkim osobom należącym do fachowego personelu medycznego, zaangażowanym w opiekę nad pacjentem oraz w przypadku pobytu w szpitalu.

Zakażenie meningokokowe może to być zakażenie opon mózgowych i rdzenia kręgowego, zwane zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Może to być również zakażenie krwi zwane posocznicą. Tego rodzaju infekcje mogą bardzo szybko przybrać postać zagrażającą życiu lub spowodować śmierć, jeżeli nie zostaną rozpoznane i odpowiednio wcześniej leczone.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na pogotowie, jeżeli wystąpią jakiegokolwiek objawy zakażenia meningokokowego.

## Ważne informacje dla fachowego personelu medycznego dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku zilukoplan

Temu Pacjentowi przepisano zilukoplan, inhibitor składnika 5 (C5) dopełniacza, który może zwiększyć podatność pacjenta na zakażenia meningokokowe wywołane przez *Neisseria meningitidis*.

Więcej informacji na temat zilukoplanu można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego ZILBRYSQ® (zilukoplan) -

<https://www.ucb.pl/produkty/lista-lekow>

### KARTA INFORMACYJNA PACJENTA

- Zakażenia meningokokowe mogą szybko stać się zagrożeniem dla życia i mogą być śmiertelne, jeżeli nie zostaną zdiagnozowane i nie będą szybko leczone.
- Należy niezwłocznie ocenić stan zdrowia pacjenta. W przypadku podejrzenia zakażenia meningokokowego należy podjąć odpowiednie środki, takie jak leczenie antybiotykami i przerwanie leczenia zilukoplanem, aż do momentu ustąpienia zakażenia meningokokowego.
- Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, który przepisał zilukoplan, jeśli istnieje podejrzenie zakażenia meningokokowego u tego pacjenta. Dane kontaktowe lekarza można znaleźć na Karcie informacyjnej pacjenta.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy przedmiotowe lub podmiotowe zakażenia meningokokowego, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem przepisującym zilukoplan.

Imię i nazwisko Pacjenta \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko lekarza przepisującego \_\_\_\_\_

Numer identyfikacyjny Pacjenta UCB-ZIL-PL-

Numer telefonu lekarza przepisującego \_\_\_\_\_

Numer telefonu kontaktowego w nagłych przypadkach \_\_\_\_\_