



Należy okazać KARTĘ PACJENTA wszystkim osobom należącym do fachowego personelu medycznego, zaangażowanym w opiekę nad pacjentem oraz w przypadku pobytu w szpitalu.

Zakażenie meningokokowe może przybierać postać zakażenia błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy, zwanego zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Może również prowadzić do zakażenia krwi, zwanego sepsą (posocznica). Są to poważne choroby, które mogą bardzo szybko stać się zagrożeniem dla zdrowia i życia, jeśli nie zostaną wcześniej rozpoznane i odpowiednio leczone.

Dlatego w przypadku wystąpienia objawów mogących świadczyć o zakażeniu meningokokowym należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).

Kartę pacjenta należy zawsze nosić przy sobie.

Natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub zgłoś się po pomoc medyczną w trybie pilnym, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów mogących wskazywać na zakażenie meningokokowe:

- ból głowy, któremu towarzyszy co najmniej jeden z następujących objawów:
— nudności lub wymioty — sztywność karku — sztywność pleców — gorączka;
- gorączka z wysypką lub bez wysypki;
- nadwrażliwość oczu na światło;
- splątanie lub senność;
- bóle mięśni z objawami grypopodobnymi

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów zakażenia meningokokowego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli nie możesz skontaktować się z lekarzem, należy wezwać pogotowie ratunkowe lub uzyskać pomoc doraźną.

Należy pokazać tę kartę osobie należącej do fachowego personelu medycznego.

Tę kartę należy zawsze mieć przy sobie przez cały okres leczenia i przez dwa miesiące po przyjęciu ostatniej dawki zilukoplanu. Zagrożenie zakażeniem meningokokowym może utrzymywać się jeszcze przez kilka tygodni po przyjęciu ostatniej dawki zilukoplanu.

▼ Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy mogące świadczyć o zakażeniu meningokokowym, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który przepisał zilukoplan.

Imię i nazwisko pacjenta _____

Imię i nazwisko lekarza przepisyującego _____

Numer telefonu lekarza przepisyującego _____

Numer telefonu kontaktowego w nagłych przypadkach _____



Ważne informacje dla fachowego personelu medycznego

Pacjentowi przepisano lek zilukoplan, który należy do grupy inhibitorów składowej C5 układu dopełniacza. Leczenie zilukoplanem może zwiększać ryzyko wystąpienia zakażeń meningokokowych wywołanych przez bakterie *Neisseria meningitidis*. Więcej informacji na temat zilukoplanu znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

KARTA PACJENTA

- Zakażenia meningokokowe mogą szybko stać się zagrożeniem dla życia i mogą być śmiertelne, jeżeli nie zostaną zdiagnozowane i nie będą szybko leczone.
- Personel medyczny powinien pilnie ocenić stan pacjenta. W przypadku podejrzenia zakażenia meningokokowego należy wdrożyć odpowiednie postępowanie, w tym leczenie antybiotykami, oraz przerwać leczenie zilukoplanem do czasu wykluczenia zakażenia meningokokowego.
- Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który przepisał zilukoplan, jeśli istnieje podejrzenie zakażenia meningokokowego u tego pacjenta. Dane kontaktowe lekarza można znaleźć na Karcie pacjenta.

Nazwa handlowa szczepionki	Serogrupa meningokoków	Numer dawki	Data podania	Cykl podstawowy / dawka przypominająca	Czy zastosowano profilaktykę antybiotykową, jeśli leczenie lekiem Zilbrysą rozpoczęto w ciągu mniej niż 2 tygodni od szczepienia
					☐ Nie dotyczy ☐ Tak, data rozpoczęcia: _____
					☐ Nie dotyczy ☐ Tak, data rozpoczęcia: _____
					☐ Nie dotyczy ☐ Tak, data rozpoczęcia: _____
					☐ Nie dotyczy ☐ Tak, data rozpoczęcia: _____

Data rozpoczęcia leczenia lekiem Zilbrysą: _____

Informacje dotyczące szczepienia przeciw meningokokom